M.S.D.N:0500465187-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THUẬN PHÁT
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

MBc PharmaMetics Products A Division of Max Biocare Pty Ltd, Level 1-2, 667 Chapel Street, South Yarra VIC 3141, Australia.

**Ingredients:** *Each coated tablet contains:*

| | |
|---|---|
| *Ginkgo biloba* leaf ext. dry conc. | 120mg |
| equiv. to dry | 6g (6,000mg) |

**Dosage:** Adults: Take one tablet 2-3 times daily, with or after meals, or as professionally prescribed; Children (12 and below): as per a healthcare practitioner's instructions.

**Storage:** Store below 30°C in a cool dry place away from heat and sunlight. Protect against moisture.

**Caution:** If symptoms persist, seek the advice of a healthcare professional. Do not take this product if allergic to any of its composition. Keep out of reach of children.

**Indications:** Maintain / support cognitive function / mental function. Enhance / improve / promote / increase cognitive performance. Maintain / support brain function. Maintain / support memory / mental recall. Maintain / support healthy blood circulation. Helps enhance / promote healthy blood circulation. Decrease / reduce / relieve mild dizziness / vertigo. Maintain / support blood circulation / flow to the peripheral areas of the body (legs, hands and feet). Helps maintain / support vasodilator / blood vessel dilation. Maintain / support cardiovascular system health. Antioxidant / Reduce free radicals formed in the body. Helps enhance / promote general health and wellbeing.

Ⓑ (Số lô SX)
MFD: (NSX)
EXP: (HD)

9 338317 000446

PM028-60UC/2

# PM Remem®

**Maintain/Support Cognitive Function/Mental Function**

Australian Made & Owned

AUST L168239

PM Remem®

# PM Remem®

MBc max biocare

AUST L168239

Maintain/Support Cognitive Function/Mental Function

Questions? Information? Visit www.maxbiocare.com

MADE IN AUSTRALIA

max biocare
Evidence Based · Natural · Trust

Maintain/Support Cognitive Function/Mental Function

- Maintain/support healthy blood circulation
- Enhance/improve/promote/increase cognitive performance
- Maintain/support brain function



60 TABLETS
MADE IN AUSTRALIA

Visa No. (SĐK): VN-.....
SẢN XUẤT TẠI ÚC

**Thành phần:** *Mỗi viên nén bao phim chứa:*

| | |
|---|---|
| Cao khô lá Bạch quả *(Extractum Folii Ginkgonis siccum)* | 120mg |
| equiv. to dry (tương đương lượng khô) | 6g (6.000mg) |

**Chỉ định, chống chỉ định, cách dùng và các thông tin khác:** Đề nghị xem trong tờ Hướng dẫn sử dụng kèm theo.

**Dạng bào chế:** Viên nén bao phim

**Đóng gói:** Hộp 4 vỉ x 15 viên nén bao phim

**Điều kiện bảo quản:** Bảo quản ở nhiệt độ dưới 30°C ở nơi khô ráo xa nóng và ánh sáng. Tránh ẩm.

**Tiêu chuẩn:** Nhà sản xuất

**Manufactured by (Sản xuất bởi):** Probiotec Pharma Pty Limited, 83 Cherry Lane, Laverton North, VIC 3026, Australia.

**Product of (Chủ cơ sở sở hữu giấy phép lưu hành tại Úc):** PharmaMetics Products A Division of Max Biocare Pty Ltd, Level 1-2, 667 Chapel Street, South Yarra VIC 3141, Australia.

**DNNK:** .....

*Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.*
*Để xa tầm tay trẻ em.*

SẢN XUẤT TẠI ÚC

64.70mm

64.70mm

M.S.D.N:0500465187-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THUẬN PHÁT
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ⓑ /Lot/Số lô SX: EXP/Hạn dùng:

# PM Remem®

**Maintain/Support Cognitive Function/Mental Function**

**AUST L 168239** **Visa No. (SĐK): .....**

**Ingredients (Thành phần):**
*Each coated tablet contains (Mỗi viên nén bao phim chứa):*

| | |
|---|---|
| Cao khô lá Bạch quả *(Extractum Folii Ginkgonis siccum)* equiv. to dry (tương đương lượng khô) | 120mg<br>6g (6.000mg) |

**MADE IN AUSTRALIA**
**(SẢN XUẤT TẠI ÚC)**

**Product of (Chủ cơ sở hữu giấy phép lưu hành tại Úc):**
PharmaMetics Products A Division of Max Biocare Pty Ltd
Level 1-2, 667 Chapel Street, South Yarra VIC 3141, Australia.

**Manufactured by (Sản xuất bởi):**
Probiotec Pharma Pty Limited
83 Cherry Lane, Laverton North, VIC 3026, Australia.

MBc
max biocare
www.maxbiocare.com
PM0028-F/1

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

# PM Remem®

*Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng*
*Để xa tầm tay trẻ em*

**Thành phần:**
*Mỗi viên nén bao phim có chứa:*

| **Thành phần hoạt chất:** | |
|---|---|
| Cao khô lá Bạch quả<br>*(Extractum Folii Ginkgonis siccum)* | 120mg |
| equiv. to dry (tương đương lượng khô) | 6g (6.000mg) |

Thành phần tá dược (Microcrystalline cellulose; Calcium phosphate; Sodium starch glycollate; Pregelatinised maize starch; Povidone; Magnesium stearate; Purified water; ACRYL-EZE Aqueous Acrylic Enteric System 93O18359 White; OPADRY II complete film coating system 85G60869 BLUE; OPADRY II complete film coating system 85G58923 WHITE.

**Dạng bào chế:** Viên nén bao phim màu xanh, viên nén tròn in nổi "M" trên một mặt.

**Dược lực học:** Bạch quả (*ginkgo biloba*) ức chế yếu tố hoạt hóa tiểu cầu (PAF), dẫn tới tác dụng kháng viêm và giảm sự kết tập tiểu cầu. Bạch quả có hiệu quả giãn mạch thông qua việc kích thích yếu tố giãn cơ trơn của nội mô mạch máu và giải phóng prostacyclin, nhằm cải thiện lưu lượng máu tới vùng ngoại biên và não. Bạch quả cải thiện lưu lượng máu cục bộ mà không làm thay đổi huyết áp động mạch trung bình, có tác dụng cải thiện vi tuần hoàn làm tăng lưu lượng máu tới mắt để cho thị lực khoẻ mạnh và có thể hỗ trợ duy trì sự cương cứng của dương vật. Trong não, bạch quả bảo vệ chống lại việc mất tế bào não. Bạch quả có lợi trong việc bảo vệ thần kinh và tuần hoàn ở những người cao tuổi, đặc biệt là hiệu quả đối với bệnh thiếu máu não và cải thiện nhận thức, bệnh đi khập khiễng cách hồi (lưu thông máu kém tới chân yếu hơn), và chóng mặt, ù tai. Bạch quả có chứa các flavonoid có vai trò loại bỏ gốc tự do. Do tác dụng chống oxy hóa và tác dụng tuần hoàn, bạch quả có thể bảo vệ mắt khỏi các bệnh như tăng nhãn áp. Bạch quả có hiệu quả trong điều trị các trường hợp giảm trí nhớ, thiếu tập trung, suy nhược, chóng mặt, ù tai hoặc đau đầu.

**Dược động học:** Sinh khả dụng đường uống của ginkgolide A, ginkgolide B và bilobalide lần lượt là: 98-100%, 79-93%, và 70%. Việc hấp thu chủ yếu xảy ra ở ruột non. Thời gian bán thải của ginkgolide A và B, và bilobalide lần lượt là 4,5, 10,6 và 3,2 giờ, với nồng độ đỉnh trong huyết tương ở thời điểm 2-3 giờ. Khoảng 70% ginkgolide A, 50% ginkgolide B, và 30% bilobalide được bài tiết dưới dạng không biến đổi trong nước tiểu.

**Chỉ định:**
- Duy trì/hỗ trợ chức năng nhận thức/chức năng tâm thần. Tăng cao/cải thiện hiệu suất các hoạt động nhận thức. Duy trì/hỗ trợ chức năng não. Duy trì/hỗ trợ trí nhớ;
- Duy trì/hỗ trợ lưu thông máu. Giúp tăng cao/cải thiện các hoạt động lưu thông máu khỏe mạnh. Giảm thiểu/giải tỏa những cơn chóng mặt nhẹ. Duy trì/hỗ trợ tuần hoàn máu/lưu thông máu đến các vùng ngoại vi của cơ thể (chân, bàn tay và bàn chân). Giúp duy trì/hỗ trợ giãn mạch máu. Duy trì/hỗ trợ sức khỏe hệ tuần hoàn;
- Giảm hình thành các gốc tự do trong cơ thể. Giúp tăng cường/cải thiện sức khỏe toàn diện chung.

**Liều dùng và cách dùng:** Người lớn: 1 viên nén/lần x 2-3 lần/ngày cùng với bữa ăn, hoặc theo chỉ dẫn của bác sĩ; Trẻ em (từ 12 tuổi trở xuống): theo chỉ dẫn của bác sĩ.

Nếu quên uống thuốc một lần, tiếp tục liều lượng quy định mà không cần bổ sung. Không được nhai thuốc.

**Chống chỉ định:**
- Phụ nữ có thai và cho con bú, rối loạn đông máu;

- Phẫu thuật: Ngừng sử dụng ít nhất 3 ngày trước khi phẫu thuật và 1 tuần sau khi phẫu thuật. Thuốc có thể tăng nguy cơ chảy máu khi dùng trong phẫu thuật;
- Bệnh nhân mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.

**Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc:** Nếu triệu chứng không thuyên giảm, cần xin ý kiến bác sĩ. Cần ngừng sử dụng thuốc nếu bị sốt cao, hoặc viêm nhiễm nặng, và chờ tới khi khỏi bệnh thì có thể uống tiếp. Nếu đang sử dụng $^{PM}$Remem® và cần sử dụng một loại thuốc điều trị có kê đơn, cần phải hỏi ý kiến của bác sĩ trước khi tiếp tục dùng song song $^{PM}$Remem® với các thuốc này. Nếu có phản ứng phụ xảy ra xin ngừng dùng thuốc và thông báo cho bác sĩ. Không sử dụng nếu bị dị ứng với bất kỳ thành phần nào trong sản phẩm.

**Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú:**
*Thời kỳ mang thai hoặc sắp có thai*
- Không sử dụng.

*Thời kỳ cho con bú*
- Không sử dụng.

**Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc:** Chưa có báo cáo.

**Tương tác, tương kỵ:** Các thuốc, thảo dược và sản phẩm bổ sung kháng đông/kháng tiểu cầu/các thuốc kháng viêm (non-steroidal anti-inflammatory): Nếu sử dụng đồng thời với ginkgo, về mặt lý thuyết có thể làm tăng nguy cơ chảy máu vì tác dụng của ginkgo lên sự kết tập khối tiểu cầu. Nên tránh sự kết hợp này hoặc tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng.

**Tác dụng không mong muốn:** Hiếm gặp, tuy nhiên có thể gây ra rối loạn tiêu hóa nhẹ, đau đầu và chóng mặt. Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

**Quá liều:**
- Triệu chứng quá liều: Rối loạn tiêu hóa, hoa mắt, chóng mặt, đau đầu, suy nhược cơ thể, nổi mề đay, ngứa ngáy.
- Cách xử trí khi dùng quá liều: Nếu gặp bất cứ hiện tượng nào do quá liều nên ngừng dùng thuốc và chờ cho hết những triệu chứng này trước khi sử dụng tiếp thuốc ở đúng liều chỉ định. Tích cực theo dõi để có biện pháp xử trí kịp thời.

**Bảo quản:** Bảo quản ở nhiệt độ dưới 30°C, để nơi khô mát, tránh nóng và ánh sáng trực tiếp. Phòng tránh ẩm.

**Quy cách đóng gói:** 15 viên nén/vỉ x 4 vỉ/hộp.

**Hạn dùng:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

**Tiêu chuẩn:** Nhà sản xuất.

**AUST L:** 168239

**Visa no. (SĐK):** .....

**Sản xuất bởi: Probiotec Pharma Pty Limited,** 83 Cherry Lane, Laverton North, VIC 3026, Úc.

**Chủ cơ sở sở hữu giấy phép lưu hành tại Úc: PharmaMetics Products A Division of Max Biocare Pty Ltd,** Level 1-2, 667 Chapel Street, South Yarra VIC 3141, Úc.

**DNNK:** .....