TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

REDISOLV®

Thiết bị y tế REDISOLV® hỗ trợ cải thiện các rối loạn chức năng đường tiêu hóa, đặc biệt trong Hội chứng ruột kích thích (IBS) với biểu hiện táo bón, tiêu chảy, đầy hơi, chướng bụng, đau bụng do co thắt đại tràng.

Dung dịch uống dạng gói – Hương lê.

1. ĐẶC ĐIỂM, THÀNH PHẦN VÀ MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG CỦA THIẾT BỊ Y TẾ

Thiết bị y tế này có khả năng giữ nước vượt trội nhờ cấu trúc sợi hòa tan, tương tự các vật liệu sinh học có khả năng ngậm nước cao, từ đó góp phần cải thiện hiệu quả các triệu chứng của Hội chứng ruột kích thích (IBS).

Trong trường hợp táo bón, hoạt chất giải phóng nước vào lòng ruột, giúp tăng thể tích và làm mềm phân. Ngược lại, trong trường hợp tiêu chảy, chất này tiếp tục hấp thu nước tại đại tràng giúp làm đặc phân.

Ngoài ra, hiệu ứng prebiotic của hoạt chất hỗ trợ phục hồi hệ vi sinh đường ruột.

Thành phần Simethicone được bổ sung giúp làm vỡ bóng khí trong lòng ruột, từ đó giảm cảm giác đầy hơi, đau bụng và co thắt.

1.1 THÀNH PHẦN

Mỗi gói chứa: **PHGG** (Guar gum thủy phân một phần) và **Simethicone.**

Tá dược: Nước tinh khiết, glycerine thực vật, sucralose, acid citric, hương lê, kali sorbate, natri benzoate, polysorbate 80, este của sucrose.

1.2 CƠ CHẾ TÁC DỤNG

Thiết bị y tế này chứa Guar gum thủy phân một phần và Simethicone, phối hợp tác động hiệp đồng nhằm cải thiện các triệu chứng liên quan đến Hội chứng ruột kích thích (IBS).

Guar gum có khả năng hấp thu một lượng lớn nước vào lòng ruột, giúp trương nở và làm tăng thể tích phân. Đồng thời, chất xơ này còn giúp giảm mức độ và tần suất tiêu chảy nhờ khả năng hấp thu và trung hòa các độc tố nội sinh và ngoại sinh.

Guar gum cũng hỗ trợ điều hòa chức năng ruột, tăng cường độ ẩm cho phân, bôi trơn và tạo khối. Ngoài ra, chất này còn liên kết với các chất có hại như acid mật dư thừa, hỗ trợ đào thải chúng ra khỏi cơ thể.

Simethicone có tác dụng phá bọt mạnh, giúp làm vỡ các bóng khí trong dạ dày – ruột, từ đó giảm nhanh cảm giác đầy hơi, chướng bụng và co thắt. Simethicone cũng hỗ trợ làm tiêu lớp bọt khí thường hình thành trong các tình trạng rối loạn tiêu hóa, đặc biệt là ở dạ dày.

2. QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

Mỗi hộp chứa 14 gói, mỗi gói 30 ml

3. LIỀU DÙNG VÀ CÁCH SỬ DỤNG

Uống 1 gói mỗi ngày. Có thể tăng liều lên tối đa 2 gói/ngày nếu cần thiết. Có thể uống nguyên chất hoặc pha loãng trong nước hoặc các loại đồ uống khác như nước ép hoặc sữa chua. Không uống trực tiếp từ gói. Thời gian sử dụng khuyến nghị là 4 tuần (28 ngày). Nếu sau thời gian này triệu chứng không cải thiện đáng kể, cần tham khảo ý kiến bác sĩ.

4. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Không sử dụng trong các trường hợp có tiền sử thoát vị hoành, hẹp thực quản hoặc tắc ruột. Nên ngừng sử dụng ít nhất 2 tuần trước khi phẫu thuật có kế hoạch. Sản phẩm có thể ảnh hưởng đến kết quả một số xét nghiệm như guaiac test. Không sử dụng nếu có tiền sử dị ứng với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm, bao gồm simethicone hoặc gôm guar.

5. TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN

Hiếm gặp: có thể gây tăng sinh khí đường ruột do gồm guar thủy phân, tuy nhiên triệu chứng này thường được cải thiện nhờ sự có mặt của simethicone. Trong trường hợp xuất hiện phản ứng bất thường, cần ngừng sử dụng sản phẩm và tham khảo ý kiến bác sĩ nếu triệu chứng kéo dài.

6. TƯƠNG TÁC VỚI THỰC PHẨM CHỨC NĂNG VÀ THUỐC

Sản phẩm có thể làm chậm hoặc giảm hấp thu của thuốc và/hoặc thực phẩm chức năng nếu sử dụng đồng thời. Nên sử dụng sản phẩm cách xa ít nhất 2 giờ với các loại thuốc khác. Trong trường hợp đang dùng thuốc tránh thai đường uống, thuốc tuyến giáp hoặc kháng sinh, cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng. Do các thành phần trong sản phẩm có thể hỗ trợ làm giảm đường huyết, bệnh nhân đái tháo đường cần hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

7. ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN

Bảo quản nơi khô ráo, tránh ánh sáng trực tiếp hoặc nguồn nhiệt. Chỉ mở gói khi sử dụng. Không sử dụng nếu bao bì bị hư hỏng. Tránh xa tầm tay trẻ em. Bảo quản ở nhiệt độ dưới 25°C.

8. CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG

Không sử dụng cho trẻ dưới 12 tuổi. Phụ nữ có thai hoặc cho con bú chỉ nên sử dụng khi thật sự cần thiết và có chỉ định của bác sĩ. Không vượt quá liều khuyến cáo vì có thể gây ra tác dụng phụ. Không sử dụng sản phẩm quá 30 ngày. Nếu triệu chứng vẫn còn, cần tham khảo bác sĩ. Mỗi gói chỉ sử dụng một lần và chỉ nên mở ngay trước khi dùng. Không dùng nếu không dung nạp với sản phẩm hoặc dị ứng với bất kỳ thành phần nào, bao gồm simethicone và gôm guar.

9. HẠN SỬ DỤNG

Không sử dụng sau ngày hết hạn in trên bao bì. Hạn sử dụng được áp dụng cho sản phẩm còn nguyên vẹn và được bảo quản đúng điều kiện.

10. HƯỚNG DẪN TIÊU HUỶ

Thiết bị y tế hết hạn cần được xử lý theo quy định về quản lý chất thải y tế của địa phương. Không được vứt bỏ sản phẩm hoặc bao bì ra môi trường.

CE 0426   

NHÀ SẢN XUẤT
SIIT S.r.l.
Via Ariosto 50/60
20090 Trezzano sul Naviglio (MI), Ý

NHÀ PHÂN PHỐI TẠI Ý & CHÂU ÂU
Aurora Biofarma S.r.l.
Via Porpora. 127
20131 Milano (MI) - Ý

NHẬP KHẨU & PHÂN PHỐI TẠI VIỆT NAM
Công ty TNHH Thương mại Trí Khang, 20/12 ngõ 36 Phương Liệt, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Hotline: 0969138181,
Website: trikhangpharma.com